FICHA TÉCNICA

TIPO DE FORMULACIÓN: suspoemulsión (SE)
USO: FUNGICIDA

INGREDIENTE ACTIVO:

SPIROXAMINA 25% + KRESOXIM METHYL 25% SE
Nombre IUPAC: Spiroxamina
8-*tert*-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine
Kresoxim methyl

methyl (E)-methoxyimino[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetate
Spiroxamina (No. CAS *118134-30-8*)

Kresoxim methyl (No. CAS *143390-89-0*)

EMPRESA FORMULADORA: INTEROC S.A.
Dirección: Km 16½ vía Daule
Guayaquil – Ecuador

TITULAR DEL REGISTRO:

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA

INTEROC CUSTER

Autopista Medellín Km 3.4
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13
Cota – Colombia
Telf: 8415771 - 8415055

REGISTRO NACIONAL ICA No. 826

MODO DE ACCIÓN:

MERIDIAN es un fungicida protectante, sistémico, curativo y erradicante. Penetra rápidamente al tejido foliar y es traslocado acropetalmente hacia la punta de la hoja. Inhibe la biosíntesis del esterol, la germinación de esporas, la enzima reductasa y la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia de electrones entre el sitio del citocromo b y c1.

Autopista Bogotá – Medellín km. 3.4 Tel: (57-1) 8415771 - 8415055
Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13 Bogotá D.C. – Colombia

USO AGRÍCOLA

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.C	P.R
Tomate (*Lycopersicum esculentum*)	*Oidium lycopersicum* (Mildeo polvoso)	0.3 cc/L	35 días	12 horas

Volumen de agua: 400 l/ha

*USO ORNAMENTALES			
CULTIVO	**BLANCO BIOLÓGICO**	**DOSIS**	**P.R**
Rosa (*Rosa sp.*)	*Sphaerotheca pannosa* (Oidium)	0.3 cc/L	12 horas

P.C: Período de carencia
P.R: Período de reentrada
** Pruebas de Fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus) Y POMPÓN (Crysantemum sp.).*

"Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada"

MODO DE EMPLEO:

MERIDIAN se aplica cuando se observan los primeros síntomas de la enfermedad (ataque temprano) y acorde con los niveles de infestación de la enfermedad y condiciones climáticas.

COMPATIBILIDAD:
MERIDIAN es incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.

PRECAUCIONES:
No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar MERIDIAN, en la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.
Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en horas tempranas.
Evite contaminar con MERIDIAN las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:
60 cc, 100 cc, 125 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 1 litro, 5 litros, 200 litros.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (1) 2886012.

AVISO AL AGRICULTOR: el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.